



Oferta specjalna dla firm

Badania w kierunku COVID-19 w siedzibie przedsiębiorstwa



Rodzaje badań na COVID-19

1. Test antygenowy

Szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do wykrywania antygeny SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Jest on przeznaczony do wczesnego rozpoznania zakażenia u pacjentów, którzy posiadają charakterystyczne objawy koronawirusa.

2. Badanie PCR

SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR. Badanie wymazów z dróg oddechowych

3. Badanie na przeciwciała - serologiczne (z krwi)


Przeciwciała SARS-CoV-2, półilościowo - przeciwciała IgA/IgM oraz IgG (młode i stare) półilościowo

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

4. Test płytkowy

Test płytkowy (nazywany też kasetkowym) identyfikuje obecność przeciwciał anty-SARS-Cov-2 w klasach IgM i IgG

Ceny badań są ustalane indywidualnie w zależności od lokalizacji oraz liczby osób do pobrania.



Test antygenowy

BIOCREREDIT COVID-19 Ag to szybki chromatograficzny test immunologiczny służący do wykrywania antygeny SARS-CoV-2 w organizmie człowieka. Jest on **przeznaczony do wczesnego rozpoznania zakażenia u pacjentów, którzy posiadają charakterystyczne objawy koronawirusa**. Dzięki możliwości uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt minut test jest stosowany jako szybkie narzędzie diagnostyczne, a jego skuteczność wynosi aż 90%.

W przypadku pacjentów bezobjawowych konieczne jest dodatkowe potwierdzenie wyniku wymazem RT-PCR.

O jego dodatnim wyniku świadczą charakterystyczne dwie kreski, które w przypadku obecności wirusa SARS-CoV-2 **pojawiają się na płytce w ciągu 15-20 minut** od umieszczenia na niej pobranego z nosogardzieli materiału.



Badanie genetyczne

SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR - badanie wymazu z dróg oddechowych


Badanie metodą RT-PCR jest testem genetycznym, który wykrywa zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Polega ono na pobraniu wymazu z gardła lub nosogardzieli, a średni czas oczekiwania na wynik trwa maksymalnie do czterech dni.

Badanie przeznaczone jest dla pacjentów, którzy posiadają objawy infekcji takie jak duszności, kaszel czy gorączka oraz dla osób, które ich nie odnotowują, ale chcą wykluczyć obecność zakażenia.

Wymaz RT-PCR to jedyny test na SARS-CoV-2 rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia i wykazujący 99% skuteczności. Wykonanie wymazu polega na pobraniu materiału specjalną wymazówką z gardła lub nosogardzieli i trwa kilkanaście sekund.



**Real Time
RT-PCR**



Badania serologiczne


Przeciwciała SARS-CoV-2, półilościowo - panel przeciwciał IgA/IgM oraz IgG

Testy na przeciwciała koronawirusa z wykorzystaniem metody półilościowej wskazują stężenie przeciwciał w krwi pacjenta, dzięki czemu mają wysoką wartość diagnostyczną. Dzięki wykonaniu testów określających obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w organizmie można stwierdzić, **czy pacjent przeszedł już chorobę w sposób bezobjawowy (klasa IgG) czy może nadal jest zakażony (klasa IgM lub IgA).**

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo

Badanie polega na ilościowym pomiarze stężenia przeciwciał IgG specyficznych dla antygeny S (białka szczytowego) wirusa SARS-CoV-2. Pozwala wykryć przebytą (również bezobjawowo lub skąpoobjawowo) infekcję. Wynik badania może wskazywać na nabycie odporności na kolejne zakażenie lub być efektem szczepienia.

Dodatni wynik testów serologicznych powinno się potwierdzić badaniem genetycznym, wykonywanym metodą Real-Time PCR.




**Analizator
automatyczny**

Test płytkowy (kasetkowy)

Test płytkowy (nazywany też kasetkowym) identyfikuje obecność przeciwciał anty-SARS-Cov-2 w klasach IgM i IgG. **Badanie pozwala stwierdzić obecnie toczącą się infekcję lub przebyte w przeszłości zakażenie Covid-19, nawet jeśli od ustąpienia objawów minęło sporo czasu.**

Do oznaczania przeciwciał wykorzystywana jest technologia złota nanokoloidalnego oraz zasada technologii analizy immunochromatograficznej. W czasie badania złoto koloidalne łączy się z cząsteczkami przeciwciał, co skutkuje czerwonym zabarwieniem obszaru kasetki informującego o przebytym zakażeniu. Przy braku przeciwciał złoto koloidalne zabarwia jedynie obszar kontrolny dla oznaczenia prawidłowego działania testu.

Badanie można wykonać w 15 minut. Pozytywny wynik świadczy o toczącej się lub przebytej infekcji oraz odporności na powtórne zakażenie.



Bezpieczeństwo badania



Profesjonalne wyposażenie

Specjalista korzysta ze sterylnych narzędzi jednorazowego użytku, dezynfekuje dłonie oraz skórę przed każdym pobraniem. W trakcie pobrania jest ubrany w kombinezon ochronny biologiczny, maseczkę FFP3 i przyłbicę. Posiada również jednorazowe rękawiczki oraz płyny dezynfekcyjne.



Kontrola objawów

Nasi specjaliści są poinstruowani o zasadach bezpieczeństwa w związku z szerzeniem się epidemii. Posiadają również całkowity zakaz wykonywania badań krwi w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów typu katar, kaszel czy gorączka.



Bezpieczne miejsce

Przychodnie jako miejsce publiczne są siedliskiem bakterii i zarasków, które osadzają się na klamkach czy krzesłach. Zamawiając badanie krwi do siedziby firmy nie narażasz swoich pracowników na zakażenie, a dodatkowo możesz przebadać ich wszystkich w krótkim czasie.

Chcesz zamówić testy? Zapraszamy do kontaktu

Napisz lub zadzwoń do nas, opowiedz o swoich potrzebach,
a przygotujemy dedykowaną ofertę dla Twojej firmy.

Dział sprzedaży

 badaniawfirmie@upacjenta.pl

 +48 22 292 47 49

 [upacjenta.pl/covid19/badania
-dla-firm-koronawirus](https://upacjenta.pl/covid19/badania-dla-firm-koronawirus)